

●就学前のお子さん

ワクチン	接種対象年齢		接種回数	標準的接種間隔・期間	
				1 期初回	1 期追加
ロタウイルス 感染症	1 価(ロタリックス) 生後 6 週 0 日後～24 週 0 日後まで 5 価(ロタテック) 生後 6 週 0 日後～32 週 0 日後まで		1 価:2 回 5 価:3 回	1 価:27 日以上の間隔で 2 回 5 価:27 日以上の間隔で 3 回 ※1 価・5 価ともに初回接種は生後 2 月～生後 14 週 6 日後まで ※ワクチンは 2 種類あり、どちらかの接種になります。効果や安全性に差はありませんが、接種期間や回数が異なります。医療機関によって取り扱っているワクチンが異なりますので、ご確認ください。	
小児用肺炎 球菌感染症	生後 2 か月から 5 歳未満		4 回	27 日以上の間隔で 3 回 ※1 歳までに 3 回接種しましょう	生後 12 月から 15 月未満で 1 回 ※初回接種終了後 60 日以上の間隔をあけて接種しましょう
B型肝炎	生後 2 か月から 1 歳未満		3 回	27 日以上の間隔で 2 回	1 回目から 139 日以上の間隔をおいて 1 回
五種混合	1 期	生後 2 か月から 7 歳 6 か月未満	4 回	20 日から 56 日の間隔で 3 回 ※1 歳までに 3 回接種しましょう	初回終了後、6 月から 18 月 までの間隔をおいて 1 回
BCG	1 歳未満		1 回	なるべく早目に受けましょう ※生後 5 月から生後 8 月までの期間	
麻しん風しん 混合	1 期	1 歳から 2 歳未満	1 回	1 歳の誕生日を迎えたら、早目に受けましょう	
	2 期	小学校就学前 1 年間 (年長児)	1 回	小学校就学前 1 年以内です ※年長相当のお子さんに個別通知いたします。	
水痘 (水ぼうそう)	1 歳から 3 歳未満		2 回	1 回目は生後 12 月から 15 月未満 2 回目は 1 回目終了後 6 月から 12 月までの間隔をおいて	
日本脳炎	1 期	満 3 歳から 7 歳 6 か月未満	3 回	6 日から 28 日間隔で 2 回 ※3 歳から 4 歳までの期間	1 期初回接種終了後、 約 1 年後に 1 回 ※4 歳から 5 歳までの期間

◆R6.4.1 より 5 種混合ワクチン接種が開始されました。4 種混合ワクチン・ヒブワクチンの初回接種をすでに開始している方は接種歴のあるワクチンと同一のワクチンをご使用いただくこととなります。ご不明な点はお問い合わせください。

